

INFORMÁCIE K POUŽITIU

Na dezinfekciu sa riedi vodou s teplotou 20-25 °C na príslušnú koncentráciu roztoku. 1 % roztok sa pripraví rozpustením 10 g prípravku v 990 ml vody. Z povrchov a predmetov vopred odstráňte viditeľné znečistenie. Roztok sa aplikuje zotretím alebo postrekom. Malé vodoodolné predmety a textilie je možné dezinfikovať ponorením do roztoku. Po predpísanom expozičnom čase musia zostať povrchy a predmety navlhčené roztokom. Povrchy a predmety, ktoré majú prísť do kontaktu s vodou, potravinami alebo krmivami, po dezinfekcii dôkladne opláchnite pitnou vodou. Pre viac informácií kontaktujte **DEZISHOP.CZ**.

POUŽITIE	KONCENTRÁCIA ROZTOKU	DÁVKOVANIE	DOBA PÔSOBNIA
Povrchová dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach a komunálnej hygiene (podlahy, predmety, hračky, odevy a pod.)	0,5 - 1 %	5 - 10 g/l	30 minút
Dezinfekcia v prostredí s výskytom mykobaktérií	1 %	10 g/l	60 minút
Povrchová dezinfekcia v živočíšnej výrobe (stajne, prepravné prostriedky) a vo veterinárnej praxi	2 %	20 g/l	30 minút
Špeciálna dezinfekcia (riziko infekcie, vysoká záťaž)	3 %	30 g/l	30 minút

NÁVOD

HALAMID® je pri použití podľa návodu vysoko účinný dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom účinku na kontrolu mikroorganizmov (baktérie, vírusy, huby a kvasinky).

Veterinárne použitie - Postriekajte alebo opláchnite povrchy a vybavenie 0,5 % roztokom Halamid® v množstve 0,3 l/m² a nechajte pôsobiť minimálne 30 minút. Pri nákazlivej chorobe použite 1% roztok. Na nebu-

lizáciu použite 2-3 % roztok v dávke 40-50 ml/m³. Dezinfikujte vozidlá 1 % roztokom. Použite Halamid® 2 % do kúpeľa na nohy. Na dezinfekciu strukov použite 0,3 % roztok po každom dojení.

Akvakultúra - Nádrže a rybníky: Odporúča sa 1 % roztok Halamid® na postrek alebo utieranie. V prípade silnej kontaminácie použite 2 % roztok v množstve min. 0,3 l/m². Nechajte voľne uschnúť.

Vybavenie, vrátane sietí - Postriekajte, opláchnite alebo namočte na 30 minút do 0,5-1 % roztoku Halamid®. Vozidlá a lode sa striekajú pri koncentrácii 1 %. Na kúpeľ nôh sa používa 2 % roztok, ktorý sa podľa potreby obnovuje.

Kontrola vonkajších mikroorganizmov - Halamid® sa pridáva do vody v koncentrácii 10 až 20 ppm (10-20 g/1000 l) najprv rozpustením požadovaného množstva v primeranom množstve vody a následným pridaním tohto roztoku do rybníka alebo nádrže. Po jednej hodine pôsobenia sa nádrž/rybník prepláchnie čerstvou vodou, maximálne 3 aplikácie týždenne v prípade závažnej infekcie. V stojatej vode sa používa koncentrácia 3 až 5 ppm raz týždenne.

NEBEZPEČENSTVO:

Zdravie škodlivý pri požití. Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie, astmy alebo dýchacie ťažkosti. Nevdychujte prach / dym / hmlu / pary / aerosóly. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranný štít na tvár.

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou.

PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich možno ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Uvoľňuje toxický plyn pri kontakte s kyselinami.

DISTRIBÚTOR PRE ČR A SR

DEZISHOP s.r.o., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava